

IMÁGENES EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Embarazo ectópico en cicatriz de cesárea previa

[Ectopic pregnancy in a previous cesarean section scar]

Osvaldo Reyes¹

1. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Panamá, Rep de Panamá.

Resumen

Paciente femenina de 24 años G4P2C1 que acude con historia de sangrado transvaginal y amenorrea de 5 semanas. Al examen físico sin hallazgos de interés. Se realiza ultrasonido vaginal que evidencia gestación de 5 semanas, con embrión con frecuencia cardíaca presente, localizado en la pared uterina anterior, en relación con cicatriz de cesárea previa. En base a la clasificación COS (Crossover sign) se determina que es un COS-1. Además, con mioma intramural de 9 cms en pared uterina anterior y adyacente al embarazo ectópico. Paciente con paridad satisfecha y embarazo no planeado. Se explican riesgos y se decide realizar histerectomía total abdominal. Imagen correspondiente al hallazgo transoperatorio que confirma diagnóstico establecido.

Abstract

A 24-year-old female patient G4P2C1 presents with a history of transvaginal bleeding and amenorrhea for 5 weeks. Physical examination showed no findings of interest. Vaginal ultrasound was performed, showing 5 weeks gestation, with embryo with heart rate present, located in the anterior uterine wall, in relation to previous cesarean scar. Based on the COS (Crossover sign) classification it is determined to be a COS-1. In addition, with intramural myoma of 9 cm in the anterior uterine wall and adjacent to the ectopic pregnancy. Patient with satisfied parity and unplanned pregnancy. Risks were explained and it was decided to perform a total abdominal hysterectomy. Image corresponding to the transoperative finding that confirms the established diagnosis.

Autor corresponsal

Dr. Osvaldo Reyes
oreyespanama@yahoo.es

Palabras claves

embarazo ectópico, cicatriz de cesárea,
histerectomía total abdominal

Key words

ectopic pregnancy, cesarean section scar,
total abdominal hysterectomy

Fecha de Recibido

5 de marzo de 2025

Fecha de Aceptación

15 de marzo de 2025

Fecha de Publicado

30 de abril de 2025

Aspectos bioéticos

Los autores declaran que se siguió
las normas institucionales éticas.

Financiamiento

Los autores declaran que no hubo
financiamiento externo para la elaboración de este trabajo.

Uso de datos

Los autores no proporcionaron declaraciones
relativas a políticas de uso o disponibilidad de datos.

Reproducción

Para uso académico personal e individual.
Prohibida reproducción para otros usos o derivados.

Paciente femenina de 24 años G4P2C1 que acude con historia de sangrado transvaginal y amenorrea de 5 semanas. Al examen físico sin hallazgos de interés.

Se realiza ultrasonido vaginal que evidencia gestación de 5 semanas, con embrión con frecuencia cardíaca presente, localizado en la pared uterina anterior, en relación con cicatriz de cesárea previa.

En base a la clasificación COS (Crossover sign) se determina que es un COS-1. Además, con mioma intramural de 9 cms en pared uterina anterior y adyacente al embarazo ectópico. Paciente con paridad satisfecha y embarazo no planeado. Se explican riesgos y se decide realizar histerectomía total abdominal.

Figura 1. Embarazo ectópico de 5 semanas localizado en cicatriz de cesárea previa.




Imagen correspondiente al hallazgo transoperatorio que confirma diagnóstico establecido.